


珍爱生命 远离毒品

保卫部应急救援大队
2026年5月



前言

随着人类跨入新世纪，新型毒品迅速流行，并以一种“伪善”的面孔出现在我们面前。新型毒品从它出现的那一天起，引发了大量违法犯罪活动以及多种疾病的扩散流行，不仅影响了人民群众的健康幸福，更影响了社会稳定和经济建设。为此，必须对全民特别是青少年进行新型毒品知识教育，使其远离新型毒品，健康成长。



目录

- 1 新型毒品基本知识
- 2 新型毒品的种类
- 3 新型毒品防范知识
- 4 参与禁毒斗争构建和谐社会



新型毒品基本知识



- 什么是新型毒品
- 新型毒品的由来
- 新型毒品与传统毒品的区别

什么是新型毒品？



所谓新型毒品是相对鸦片、海洛因等传统毒品而言，主要指人工化学合成的致幻剂、兴奋剂类毒品，是由国际禁毒公约和我国法律法规所规定管制的、直接作用于人的中枢神经系统，使人兴奋或抑制，连续使用能使人产生依赖性的一类精神药品(毒品)。目前我国流行滥用的摇头丸等新型毒品多发生在娱乐场所，所以又被称为“俱乐部毒品”、“休闲毒品”、“假日毒品”。

新型毒品的由来

新型毒品的由来

1919年，日本一位化学家首次合成了后来被称之为冰毒的甲基苯丙胺。

在二战期间，甲基苯丙胺作为抗疲劳剂在士兵中广为使用。60年代一些欧、美国家，主要在夜总会、酒吧、迪厅、舞厅中滥用这类毒品。90年代后，以冰毒、摇头丸为代表的舞会药从早期的摇滚乐队、流行歌手和一些亚文化群体蔓延至以青少年群体为主的社会各阶层。



新型毒品与传统毒品的区别



新 型 毒 品

人工合成

人体主要有兴奋、抑制或致幻的作用

片剂或粉末

吸食前犯罪为了获取毒资而去
杀人、抢劫、盗窃

传 统 毒 品

植物再加工

对人体则主要以"镇痛"、"镇静"为主。

多采用吸烟式或注射等方法

吸食后导致行为失控造成暴力犯罪



新型毒品的种类

新型毒品的种类

根据新型毒品的毒理学性质，可以将其分为四类：

中枢兴奋作用为主

包括甲基苯丙胺
(俗称冰毒)在内的
苯丙胺类兴奋剂；

致 幻 剂

麦角乙二胺(LSD)、
麦司卡林和分离性麻
醉剂(苯环利定和氯
胺酮)；

兼具兴奋
和致幻作用

二亚甲基双氧安非
他明(MDMA, 我国
俗称摇头丸)；

中枢抑制作用为主

三唑仑、氟硝安定和
 γ -羟丁酸等。



冰 毒

(甲基苯丙胺)

吸食后会产生强烈的生理兴奋，降低免疫功能，严重损害心脏、大脑组织甚至导致死亡。吸食成瘾者还会造成精神障碍，表现出妄想、好斗等。

摇头丸

在药物的作用下，使人行为失控，常常引发集体淫乱、自残与攻击行为，并可诱发精神分裂症及急性心脑血管疾病。

K 粉

服用后会产生意识与感觉的分离状态，导致神经中毒反应、幻觉和精神分裂症状，表现为头昏、精神错乱、过度兴奋、幻觉、幻视、幻听、运动功能障碍、抑郁以及出现怪异和危险行为。同时对记忆和思维能力都造成严重的损害。

咖啡因

吸食危害:大剂量长期使用会对人体造成损害，引起惊厥、导致心律失常，并可加重或诱发消化性肠道溃疡，甚至导致吸食者下一代智能低下、肢体畸形，

安纳咖

苯甲酸钠咖啡因

除了会产生药物耐受性需要不断加大用药剂量外，也有与咖啡因相似的药物依赖性和毒副作用。

氟硝安定

镇静、催眠作用较强，对所发生的事情失忆。氟硝安定与酒精和其它镇静催眠药合用后可导致中毒死亡。

麦角乙二胺 (LSD)

服用后会产生幻视、幻听和幻觉，出现惊惶失措、思想迷乱、疑神疑鬼、焦虑不安、行为失控和完全无助的精神错乱的症状。同时会导致失去方向感、辨别距离和时间的能力，因而导致身体严重受伤和死亡。

安 眠 酮

通用名称:甲喹酮，又称海米那，眠可欣。主要成分是安眠酮和麻黄素，服用这两种药片后会产生打瞌睡、似酒醉、走起路来摇摇晃晃的状态，故叫“忽悠悠”。

三 唑 仑

是一种强烈的麻醉药品，口服后可以迅速使人昏迷晕倒，故俗称迷药、蒙汗药、迷魂药。昏睡期间对外界无任何知觉。服用后还使人出现狂躁、好斗甚至人性改变等情况。

γ -羟丁酸 (GHB)

吸食反应:使用后可导致意识丧失、心率缓慢、呼吸抑制、痉挛、体温下降、恶心、呕吐、昏迷或其他疾病发作。特别是当与苯丙胺类中枢神经兴奋剂合用时，危险性增加。与酒精等其他中枢神经抑制剂合用可出现恶心和呼吸困难，甚至死亡。

丁 丙 诺 啡

吸食反应:吸食后头晕、头痛、恶心、呕吐、嗜睡、晕厥、呼吸抑制，连续使用能使人产生依赖性。

麦 司 卡 林

吸食危害:主要是导致精神恍惚，服用者可发展为迁延性精神病，还会出现攻击性及自杀、自残等行为。

**苯环利定
(PCP)**

吸食反应:情绪不稳、兴奋躁动、失去痛感、神经麻木，继而注意力不能集中，产生思维障碍，逐渐出现幻觉，有的还因此导致进攻行为或自残行为。

止 咳 水

服用后会出现昏昏欲睡、便秘、恶心、情绪不稳定、睡眠失调等症状，过量滥用，可导致抽筋、神智失常、中毒性精神病、昏迷、心跳停止及呼吸停顿引致窒息死亡。

迷幻蘑菇

吸食后即会出现健谈、性欲亢进等生理异常反应。吸食危害:过量吸食会出现呕吐、腹泻、大量流汗、血压下降、哮喘、急性肾衰竭、休克等症状或因败血症猝死。心脏有问题的人服用后可导致休克或突然死亡。

地西泮

吸食危害:久服骤停可引起惊厥、震颤、痉挛、呕吐、出汗等戒断症状。用药过量有可导致急性中毒，表现为动作失调、肌无力、言语不清、精神混乱、昏迷、反射减弱和呼吸抑制直至死亡等，可也引起精神错乱、关节肿胀、血压下降等。



新型毒品防范知识

- 学校如何防范新型毒品
- 家庭如何教育孩子不沾毒品
- 娱乐场所如何拒绝新型毒品
- 青少年是新型毒品预防教育重点对象
- 青少年吸食新型毒品的诱因
- 新型毒品的致病机理



学校如何防范新型毒品

- 加强对青少年学生的新型毒品预防教育工作，提高自我保护意识和防范能力。
- 讲解有关正确对待青春期、提高自尊心、调节情绪、面对压力、对待挫折等心理健康知识，
- 教育青少年学生拒绝进入歌舞厅等娱乐场所，远离吸毒人群，引导学生自觉抵御新型毒品的诱惑。
- 积极组织和鼓励学生参与禁毒活动等。



家庭如何教育孩子不沾毒品

注意孩子的饮食起居，要及时掌握他们的交友情况与生活规律。只有这样，发现异常情况才能及时给予帮助。

- 培养孩子健康良好的生活习惯，引导孩子健康成长。
- 家长要掌握了解新型毒品的危害和禁毒知识，成为子女拒绝毒品的教师。
- 以身作则，在孩子面前更要做榜样，首先不能沾染毒品。
- 尽量少让孩子去治安复杂场所。
- 教育孩子慎交朋友。教育孩子从小不随便接受陌生人的礼物。
- 发现孩子性格和行为有异常表现，应引起警惕。



娱乐场所 如何拒绝新型毒品

- 对从业人员进行禁毒宣传和教育，督促其自觉履行防毒、拒毒义务。
- 组织从业人员积极参加公安机关举办的禁毒培训
- 在场所内设定、张贴禁毒警示牌、宣传画和举报电话。
- 实时巡查，积极预防涉毒违法犯罪活动的发生。
- 开展禁毒承诺活动，有效推动娱乐场所内部建立禁毒自律管理制度。
- 发现涉毒违法犯罪活动的，业主以及场所内工作人员应当予以制止和立即报警，并积极保护现场和配合公安机关依法查处等。





青少年是新型毒品预防教育:

随着新型毒品的泛滥，青少年已经日益明显地成为最容易受这类毒品侵害的高危人群之一。

许多青少年出于好奇或是在不知不觉的情况下开始接触毒品，毒贩们也常采用各种招数诱惑孩子们吸毒。因此我们需要动员社会的各种资源、采用科学的方式去解决。

通过培养青少年的品质和精神来预防新型毒品滥用，追求有意义的人生目标，以健康的生活方式生活。



青少年吸食新型毒品的诱因

1. 无 知 和 轻 信：
- 2、 贪慕虚荣、赶时髦：错误的人生观。
- 3、 借助吸毒逃避现实，寻求解脱
- 4、 交 友 不 慎。
5. 赌 气 或 逆 反 心 理。
6. 追 求 刺 激 和 享 乐；
- 7、 受 毒 贩 引 诱；
- 8、 在特定环境下使用新型毒品。

■ 吸毒损害身体健康

A、新型毒品导致神经系统疾病

B、新型毒品易成瘾

C、吸食毒品摧残人的生命



吸毒祸害家庭



- 耗费大量钱财
- 导致家庭破裂
- 贻害后代

吸毒危害社会

吞噬社会巨额财富，
危及国家经济

严重败坏社会风气

诱发多种犯罪，
影响社会安定

严重危害年轻一代

严重破坏
生态环境



毒贩子的毒招

1. “免费”提供的新型毒品诱饵，产生依赖性后毒贩们再以高价出售毒品给上瘾者，
2. 谎言：吃了以后没有多大危害，身体没有依赖，不会成瘾。
3. 谎言：吸了能减肥引诱青少年吸毒。吸毒成瘾后，人体的各种器官功能都受到损害，各种疾病缠身，所以面黄肌瘦、骨瘦如柴。



青少年“自卫防毒”术

- 1、不要进入治安复杂的场所。
- 2、有警觉戒备意识，不轻易和陌生人搭讪，不接受陌生人提供的香烟和饮料；
- 3、不要盲目攀比，盲目追求时尚。
- 4、不要滥用药品(减肥药、兴奋药、镇静药等)。
- 5、遇到无法排解的事端，设法寻找正确的解决途径，不沉溺其中，自暴自弃，更不能借毒解愁。





**参与禁毒斗争
构建和谐社会**

我国对新型毒品违法犯罪的法律规定

- 走私、贩卖、运输、制造毒品罪
- 走私制毒物品罪
- 非法买卖制毒物品罪
- 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪
- 强迫他人吸毒罪
- 容留他人吸毒罪
- 非法提供麻醉药品、精神药品罪
- 包庇毒品犯罪分子罪
- 窝藏转移、隐瞒毒品、毒赃罪
- 非法持有毒品罪



如何配合公安机关打击新型毒品犯罪

- 在娱乐场所看到吸食、贩卖新型毒品现象时一定要向公安机关及时举报
- 发现制造新型毒品的窝点一定要及时向公安机关报告
- 《全国人大常委会关于禁毒的决定》规定，对公民中检举、揭发走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪活动的人员以及在禁毒工作中有功的人员，应当给予奖励。




如何识别吸食新型毒品人员

- 无故旷课、旷工，学习成绩、工作表现突然变差。
- 在家中或单位偷窃钱物，或突然频频地向父母亲友借钱。
- 突然出现幻听、幻觉、妄想症状(特别是从娱乐场所出来后或服减肥药后)。
- 近段时间出现雷同行为现象，即经常机械性地反复相似的动作。
- 性格、情绪出现明显变化，如多疑、猜疑、暴躁等。
- 消瘦明显，老化明显。
- 出现牙磨损、坏牙、瞳孔放大，腹泻、呕吐、恶心等症状。
- 老产生皮肤上有小虫爬的假象而搔、抓导致皮肤溃烂。



如何识别制毒加工厂



制毒过程识别法

不公开招工，管理、技术人员行为诡秘，严格限制外人进入

场地观察法

偏僻、废弃的厂房用窗帘、报纸或砖头封堵、遮挡所有窗户使用、安装监控摄像头；农村地区用铁丝网、看家犬来阻止陌生人进入。

排出物、废弃物判断法

废气有浓烈异味，废水是带有泡沫的刺鼻白色黏稠状液体。有大量盛装过易制毒化学品的玻璃瓶、胶罐、包装物

设备辨别法

制造摇头丸的工场与此类似，不同之处在于一般还会有烘干箱、粉碎机、搅拌机、压片机、封口机、金属模具、钢筛等设备。生产、加工K粉的设备有：加热炉、粉碎机、搅半机、微波炉、冰箱、封口机、衡器。